

110學年COVID-19疫苗 校園接種說明

左營高中110.9.14



左營高中學生BNT疫苗校園集中接種說明

- 接種時間：110年9月29日（三）、30日（四），共1.5日
- 接種地點：本校圖書館及圖書館前空地
- 各班時程：依據導師隨班陪同為原則（課務調整與安排）
- 醫療團隊：高雄榮總醫療團隊
- 注意事項：
 1. 接種當日課程安排為靜態活動
 2. 接種後兩週(9/29~10/15)課程安排減少激烈教學活動
 3. 每位同學發放一張接種須知+一張接種評估意願書



疫苗接種評估劑意願書填寫說明

BioNTech(BNT162b2) COVID-19 疫苗

學生接種評估暨意願書

高雄 縣(市) 學校名稱：左營高中

1

我已詳閱 BioNTech(BNT162b2) COVID-19 疫苗學生接種須知，瞭解本疫苗需接種兩劑，亦瞭解疫苗之保護效力、副作用及禁忌與注意事項，
同意 不同意我的子女接種 BioNTech(BNT162b2) COVID-19 疫苗。
◆ 接種方式(擇一勾選) 於校園集中接種 至衛生所/合約醫療院所接種
學生姓名：_____ (_____ 年 _____ 班 _____ 號)
身分證/居留證/護照字號：_____
出生日期：(西元) _____ 年 _____ 月 _____ 日
家長簽名：_____ 身分證/居留證/護照字號：_____

2

◆ 接種前自我評估

評估內容	評估結果	
	是	否
1. 過去注射疫苗或藥物是否有嚴重過敏反應史。		
2. 現在身體有無不適病徵(如發燒 38°C、嘔吐、呼吸困難等)。		
3. 是否為免疫低下者，包括接受免疫抑制劑治療者。		
4. 過去 7 天內是否曾接種其他疫苗。		
5. 目前是否懷孕。		

3

◆ 體溫：_____°C

適合接種 不適宜接種：原因_____

評估日期：_____年_____月_____日

醫療院所十碼代碼：_____ 醫師簽章：_____

9/14 (二) 前整班繳回
勾選不同意也需簽名繳回

(1) 請每位同學與家長詳細閱讀，並勾選【我已詳閱】
(2) 勾選同意或不同意接種疫苗
(3) 擇一選擇接種方式
(4) 將學生姓名、班級座號、身分證、出生日期等欄位填寫清楚。
(5) 無論同意或不同意，【家長一定要簽名-請簽正楷全名】

(1) 選擇在校園接種者，請繼續勾選【接種前自我評估】
(2) 選擇在衛生所/合約醫療院所接種者，不用勾選【接種前自我評估】

此部分內容，於【接種當天】由醫護人員填寫！

教育部公告資訊 (09.06)



學生接種

全國滿12歲至高中/五專前3年學生

BNT 疫苗

- 自由意願選擇
- 同學互相尊重
- 充分瞭解資訊



教育部公告資訊 (09.06)



接種對象及順序

接種對象 110學年度第一學期註冊

- 國中 ■ 高中 ■ 五專前3年
- 9/1前滿12歲國小學生


包含：特教學校、實驗教育、矯正學校及少年觀護所、境外臺校、
外僑學校、中正預校、大學附設七年一貫學制

接種順序


自高中/五專起依序安排接種順序



教育部公告資訊 (09.06)



教育部公告資訊 (09.06)



教育部公告資訊 (09.06)



接種方式（一） 校園集中接種

9/23起開始接種，建議為週一至週五中午過後

校園防疫以家長不陪同為原則

接種後：

1. 疫苗接種後，學校提供「接種後注意事項」
2. **接種當日**學校調整課程內容，安排靜態活動
3. 學校觀察學生身體狀況，如有身體不適即連絡家長或協助送醫
4. **疫苗接種後2週**，學校妥善規劃課程內容、調整教學方式及減少激烈教學活動



教育部公告資訊 (09.06)



接種方式（二） 醫療院所接種

- 至疫苗預約平台登記及預約後，至指定醫療院所接種疫苗
- 登記及預約時間另行公布
- 自行至醫療院所接種，建議家長可陪同

接種對象

1. 學生身體狀況經評估建議至醫療院所接種
2. 意願書勾選在醫療院所接種
3. 國小滿12歲、在家自學、境外臺校在國內學生
4. 經地方衛生單位評估，無法實施校園集中接種



教育部公告資訊 (09.06)



接種方式 (三) 疫苗預約平台

- 學生自行至疫苗預約平台登記及預約
- 登記及預約時間另行公布

接種對象

1. 無國內學籍，滿12歲至未滿18歲
2. 就讀大專校院(含專四專五)且未滿18歲



教育部公告資訊 (09.06)



疫苗假

- 1 各級學校學生接種疫苗後，如有不良反應，可申請疫苗假，**不列入出席紀錄**
- 2 疫苗假以3天為原則(含接種當日)，必要時得延長
- 3 家長如需請假照顧，**可請防疫照顧假**



中央流行疫情指揮中心公告資訊 (09.09)

暈針如何預防

暈針多因對打針的心理壓力與恐懼感造成，通常在注射時或注射後5分鐘內出現暈眩、噁心等。大規模接種時偶爾會發生聚集性暈針現象。

暈針與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康後遺症。



接種前不宜空腹
等待時間不宜過久



可透過音樂、影片
或聊天舒緩情緒



接種時採坐姿，
接種後安靜休息

